

Mittlere-Reife-Prüfung 2008 Mathematik I Aufgabe B1

Aufgabe B1.0

Gegeben ist die Funktion f mit der Gleichung $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$ mit $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Aufgabe B1.1 (2 Punkte)

Geben Sie die Definitionsmenge und die Wertemenge der Funktion f sowie die Gleichung der Asymptote h an.

Aufgabe B1.2 (2 Punkte)

Tabellarisieren Sie die Funktion f für $x \in [-7; 2]$ mit $\Delta x = 1$ auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet und zeichnen Sie den Graphen zu f in ein Koordinatensystem.

Für die Zeichnung: Längeneinheit 1 cm ; $-8 \leq x \leq 3$; $-7 \leq y \leq 4$.

Aufgabe B1.3 (3 Punkte)

Der Graph der Funktion f wird durch orthogonale Affinität mit der x -Achse als Affinitätsachse und dem Affinitätsmaßstab $k = -2$ auf den Graphen der Funktion f' abgebildet.

Zeigen Sie rechnerisch, dass die Funktion f' die Gleichung $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4$ besitzt und zeichnen Sie den Graphen zu f' in das Koordinatensystem zu 1.2 ein.

Aufgabe B1.4 (2 Punkte)

Punkte A_n auf dem Graphen zu f und Punkte B_n auf dem Graphen zu f' haben dieselbe Abszisse x und sind für $x > -5$ zusammen mit Punkten C_n die Eckpunkte von gleichschenkelig-rechtwinkligen Dreiecken $A_n B_n C_n$ mit den Hypotenusen $[A_n B_n]$.

Zeichnen Sie die Dreiecke $A_1 B_1 C_1$ für $x = -3$ und $A_2 B_2 C_2$ für $x = -1$ in das Koordinatensystem zu 1.2 ein.

Aufgabe B1.5 (4 Punkte)

Zeigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt A der Dreiecke $A_n B_n C_n$ in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte A_n und B_n gilt:

$$A(x) = \left(-3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+5} + 3\right)^2 \text{ FE.}$$

Aufgabe B1.6 (2 Punkte)

Das Dreieck $A_3 B_3 C_3$ hat den Flächeninhalt 2,25 FE.

Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes B_3 .

Aufgabe B1.7 (2 Punkte)

Begründen Sie, dass die y -Koordinate der Punkte C_n nicht den Wert -1 annehmen kann.

Lösung

Aufgabe B1.0

Gegeben ist die Funktion f mit der Gleichung $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$ mit $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Aufgabe B1.1 (2 Punkte)

Geben Sie die Definitionsmenge und die Wertemenge der Funktion f sowie die Gleichung der Asymptote h an.

Lösung zu Aufgabe B1.1

Definitionsbereich bestimmen

$$y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$$

Erläuterung: *Exponentialfunktion*

Die Funktion $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$ ist eine Exponentialfunktion.
Der Definitionsbereich einer Exponentialfunktion ist stets \mathbb{R} .

$$D_f = \mathbb{R}$$

Wertemenge einer Funktion

$$W_f =] - \infty; 2[$$

Erläuterung: *Wertebereich der Exponentialfunktion*


Die Funktion $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$ ist eine Exponentialfunktion.

Weil ein Minuszeichen vor der Potenz steht, ist der „linke Rand“ des Wertebereichs $-\infty$.

$$\Rightarrow W_f =] - \infty;$$

Die „+2“ begrenzt den „rechten Rand“ des Wertebereichs.

$$\Rightarrow W_f =] - \infty; 2[$$



Asymptoten einer Funktion

$$h : y = 2 \quad (\text{waagerechte Asymptote})$$

Erläuterung: *Asymptote einer Exponentialfunktion*

Eine Exponentialfunktion hat immer eine waagerechte Asymptote. Sie kann direkt von der Wertemenge abgelesen werden.

Wenn die Wertemenge z.B. $W_f =]1; \infty[$ lautet, dann ist $y = 1$ die waagerechte Asymptote.

Hier:

$$W_f =] - \infty; 2[\Rightarrow y = 2$$

Aufgabe B1.2 (2 Punkte)

Tabellarisieren Sie die Funktion f für $x \in [-7; 2]$ mit $\Delta x = 1$ auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet und zeichnen Sie den Graphen zu f in ein Koordinatensystem.


Für die Zeichnung: Längeneinheit 1 cm ; $-8 \leq x \leq 3$; $-7 \leq y \leq 4$.

Lösung zu Aufgabe B1.2**Wertetabelle**

$$f : y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$$

Wertetabelle für $x \in [-7; 2]$:

x	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$	-6	-2	0	1	1,5	1,75	1,88	1,94	1,97	1,98

Skizze**Aufgabe B1.3** (3 Punkte)

Der Graph der Funktion f wird durch orthogonale Affinität mit der x -Achse als Affinitätsachse und dem Affinitätsmaßstab $k = -2$ auf den Graphen der Funktion f' abgebildet.

Zeigen Sie rechnerisch, dass die Funktion f' die Gleichung $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4$ besitzt und zeichnen Sie den Graphen zu f' in das Koordinatensystem zu 1.2 ein.

Lösung zu Aufgabe B1.3**Orthogonale Affinität**

$$f : y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$$

Zu zeigen: $f' : y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4$

Erläuterung: *Orthogonale Affinität*

Wird der Graph einer Funktion f durch orthogonale Affinität mit der x -Achse als Affinitätsachse und dem Affinitätsmaßstab k auf den Graphen einer Funktion f' abgebildet, so gilt:

$$y' = k \cdot y$$

In Matrixform: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$y' = k \cdot y$$

$$y' = -2 \cdot \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2 \right] \quad | \quad \text{Klammer auflösen (ausmultiplizieren)}$$

$$y' = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} - 4 \quad | \quad 2 \text{ in einen Bruch umwandeln}$$

Erläuterung: *Potenzregeln*

Die Regel die verwendet wird: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{a}\right)^{-n}$ (Kehrbruch)

Hier:

$$2 = \left(\frac{2}{1}\right)^1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

$$y' = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}}_2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} - 4$$

Erläuterung: *Potenzregeln*

Die Regel die verwendet wird: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Wenn die Basis (hier " a ") gleich ist, dann können die Exponenten (hier " m " und " n ") addiert werden.

Hier:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1+x+4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3}$$

$$y' = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4$$

$$\Rightarrow f' : y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4$$

Wertetabelle


Wertetabelle aus Teilaufgabe B 1.2 ausnutzen:

Erläuterung: *Orthogonale Affinität*

Wegen der orthogonalen Affinität erhält man die y' -Werte von f' indem man die y -Werte von f mal -2 multipliziert.

x	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$	-6	-2	0	1	1,5	1,75	1,88	1,94	1,97	1,98
$y' = -2 \cdot y$	12	4	0	-2	-3	-3,5	-3,75	-3,88	-3,94	-3,97


Skizze

**Aufgabe B1.4** (2 Punkte)

Punkte A_n auf dem Graphen zu f und Punkte B_n auf dem Graphen zu f' haben dieselbe Abszisse x und sind für $x > -5$ zusammen mit Punkten C_n die Eckpunkte von gleichschenkelig-rechtwinkligen Dreiecken $A_n B_n C_n$ mit den Hypotenusen $[A_n B_n]$. Zeichnen Sie die Dreiecke $A_1 B_1 C_1$ für $x = -3$ und $A_2 B_2 C_2$ für $x = -1$ in das Koordinatensystem zu 1.2 ein.


Lösung zu Aufgabe B1.4

Skizze




Erläuterung: *Einzeichnen*

Ein gleichschenkelig-rechtwinkliges Dreieck hat zwei gleich lange Seiten und zwei gleich große Winkel. Da ein Winkel bereits 90° groß ist, haben die restlichen ein Maß von 45° (Summe der Innenwinkel eines Dreiecks ist immer gleich 180°).



Die Punkte C_n liegen auf dem Thaleskreis über der Strecke $[A_n B_n]$ auf der Höhe der Mittelpunkte M_n (der Strecke $[A_n B_n]$).

Somit ist der Winkel bei C_n ein rechter Winkel, die Strecken $[A_n M_n]$ bzw. $[B_n M_n]$ und $[M_n C_n]$ gleich lang (Radius des Thaleskreises) und demzufolge gilt dann: $[B_n C_n] = [A_n C_n]$.




Aufgabe B1.5 (4 Punkte)

Zeigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt A der Dreiecke $A_n B_n C_n$ in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte A_n und B_n gilt:

$$A(x) = \left(-3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 \right)^2 \text{ FE.}$$

Lösung zu Aufgabe B1.5

Flächeninhalt eines Dreiecks



Erläuterung: *Flächeninhalt eines Dreiecks*

Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist stets gegeben durch:

$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$$

h_a ist die zur (Grund-)Seite a zugehörige Höhe.

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot \overbrace{A_n B_n}^{\frac{1}{2} \cdot A_n B_n} \cdot \overbrace{M_n C_n}^{\frac{1}{2} \cdot A_n B_n}$$

Erläuterung: *Thaleskreis*

$[M_n C_n]$ ist der Radius des Thaleskreises über $[A_n B_n]$.

$$\Rightarrow \overline{M_n C_n} = \frac{1}{2} \cdot \overline{A_n B_n}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot \overline{A_n B_n} \cdot \frac{1}{2} \cdot \overline{A_n B_n}$$

$$A(x) = \frac{1}{4} \cdot \overline{A_n B_n}^2$$

Erläuterung: *Länge einer Strecke*

Die Länge der Strecke $[A_n B_n]$ entspricht der Differenz der y -Koordinaten von A_n und B_n , da sie die selbe Abszisse x haben.

$$y_{A_n} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2 \quad (A_n \in f)$$

$$y_{B_n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4 \quad (B_n \in f')$$

$$y_{A_n} - y_{B_n} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2 - \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4\right)$$

$$A(x) = \frac{1}{4} \cdot \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} + 4 \right]^2$$

Erläuterung: *Potenzregeln*

Die Regel die verwendet wird: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Beispiel:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} = \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$A(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 6 \right]^2$$

$$A(x) = \left[\frac{1}{2} \cdot \left(-\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 6 \right) \right]^2 \quad | \quad \text{innere Klammer auflösen}$$

Erläuterung: *Potenzregeln*

Die Regel die verwendet wird: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Wenn die Basen (a) gleich sind, dann können die Exponenten (m, n) addiert werden.

Beispiel:

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+4} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$A(x) = \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^5 - \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 3 \right]^2 \quad | \quad -\left(\frac{1}{2}\right)^x \text{ ausklammern}$$

$$A(x) = \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^x \cdot \left[\underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^5}_{1/32} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^4}_{2/32} \right] + 3 \right]^2$$

Erläuterung: *Rechenweg*

$$\left(\frac{1}{2}\right)^5 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{32} + \frac{1}{16} = \frac{1}{32} + \frac{2}{32} = \frac{3}{32}$$

$$A(x) = \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^x \cdot \underbrace{\frac{3}{32}}_{3 \cdot (1/2)^5} + 3 \right]^2$$

Erläuterung: *Rechenweg*

$$\frac{3}{32} = 3 \cdot \frac{1}{32} = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

$$A(x) = \left[-3 \left(\frac{1}{2} \right)^x \left(\frac{1}{2} \right)^5 + 3 \right]^2$$

Erläuterung: *Potenzregeln*

Die Regel die verwendet wird: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Wenn die Basen (a) gleich sind, dann können die Exponenten (m,n) addiert werden.

Hier:

$$\left(\frac{1}{2} \right)^x \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5}$$

$$A(x) = \left[-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 \right]^2$$

Aufgabe B1.6 (2 Punkte)

Das Dreieck $A_3 B_3 C_3$ hat den Flächeninhalt 2,25 FE.
Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes B_3 .

Lösung zu Aufgabe B1.6

Flächeninhalt eines Dreiecks

Aus Teilaufgabe B 1.5 ist bekannt: $A(x) = \left[-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 \right]^2$

$$\left[-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 \right]^2 = 2,25 \quad | \quad \sqrt{\quad}$$

$$\sqrt{\left[-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 \right]^2} = \sqrt{2,25}$$

Erläuterung: *Länge einer Strecke*

In Teilaufgabe 1.6 wird gezeigt, dass $A(x) = \left(\frac{1}{2} \cdot \overline{A_n B_n} \right)^2$. Die Länge der Strecke $[A_n B_n]$ ist positiv und somit auch der Ausdruck $\left[-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 \right]$.

Keine Betragsstriche bei Längen und Flächeninhalten! (sind immer positiv).

$$-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} + 3 = 1,5 \quad | \quad -3$$

$$-3 \left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} = -1,5 \quad | \quad : (-3)$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} = 0,5$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{x+5} = \left(\frac{1}{2} \right)^1$$

Erläuterung: *Potenzen mit gleicher Basis*

Zwei Potenzen mit der gleichen Basis sind gleich, wenn auch die Exponenten gleich sind.

Hier:

Beide Potenzen haben die selbe Basis $\frac{1}{2}$. Also müssen die Exponenten $x+5$ und 1 gleich gesetzt werden.

$$x+5 = 1 \quad | \quad -5$$

$$\Rightarrow x = -4$$

Koordinaten von Punkten ermitteln

y-Koordinate von B_3 bestimmen:

$$f' : y = \left(\frac{1}{2} \right)^{x+3} - 4$$

Erläuterung: *Einsetzen*

$x = -4$ wird in die Funktionsgleichung von f' eingesetzt, da laut Teilaufgabe 1.4 die Punkte B_n auf dem Graphen von f' liegen.

$$B_3 \in f' \Rightarrow y_{B_3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4+3} - 4 = -2$$

$$\Rightarrow B_3(-4 | -2)$$

Aufgabe B1.7 (2 Punkte)

Begründen Sie, dass die y -Koordinate der Punkte C_n nicht den Wert -1 annehmen kann.

Lösung zu Aufgabe B1.7

Mittelpunkt einer Strecke

Annahme: der y -Wert der Punkte C_n **kann** den Wert -1 annehmen.

$$y_{C_n} = -1$$

Erläuterung: *Mittelpunkt einer Strecke*

Punkte C_n liegen auf der selben Höhe (y -Koordinate) wie die Mittelpunkte der Strecken $[A_n B_n]$ (siehe Teilaufgabe 1.4).

Der Mittelpunkt M einer Strecke $[AB]$ mit $A(x_1|y_1)$ und $B(x_2|y_2)$ ist gegeben durch:

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \mid \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$\frac{y_{A_n} + y_{B_n}}{2} = -1 \quad | \cdot 2$$

$$y_{A_n} + y_{B_n} = -2$$

Erläuterung: *Punktkoordinaten*

Laut Teilaufgabe 1.4 liegen die Punkte A_n auf dem Graphen von f und die Punkte B_n auf dem Graphen von f' .

$$\Rightarrow y_{A_n} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2$$

$$\Rightarrow y_{B_n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4$$

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} - 4 = -2 \quad | +2$$

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4} + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} = 0 \quad | +\left(\frac{1}{2}\right)^{x+4}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+4}$$

Erläuterung: *Potenzen mit gleicher Basis*

Zwei Potenzen mit der gleichen Basis sind gleich, wenn auch die Exponenten gleich sind.

Hier:

Beide Potenzen haben die selbe Basis $\frac{1}{2}$. Also müssen die Exponenten $x+5$ und $x+4$ gleich gesetzt werden.

$$x+3 = x+4 \quad | -x$$

$$3 = 4 \quad \text{falsche Aussage!}$$

Die Annahme führt zu einer falschen Aussage, also stimmt sie nicht.

\Rightarrow Die y -Koordinate von C_n kann den Wert -1 nicht annehmen.