
Mittlere-Reife-Prüfung 2013 Mathematik I Aufgabe A2

Aufgabe A2.

Die untenstehende Zeichnung zeigt ein Schrägbild der Pyramide $ABCS$, deren Grundfläche das gleichseitige Dreieck ABC ist. Der Fußpunkt T der Pyramidenhöhe $[ST]$ teilt die Dreieckshöhe $[MB]$ des gleichseitigen Dreiecks ABC im Verhältnis $\overline{MT} : \overline{TB} = 1 : 2$.
Es gilt: $\overline{MB} = 6$ cm; $\sphericalangle SBM = 65°$.

In der Zeichnung gilt:
$q = \frac{1}{2}$; $\omega = 45°$; $[MB]$ liegt auf der Schrägbildachse.

Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma.



Aufgabe A2.1 (1 Punkt)

Berechnen Sie die Länge der Strecke $[ST]$.
[Ergebnis: $\overline{ST} = 8,58$ cm]

Aufgabe A2.2 (1 Punkt)

Punkte P_n liegen auf der Strecke $[BS]$. Die Winkel BMP_n haben das Maß φ mit $\varphi \in [0°; 76,88°]$. Die Punkte P_n sind zusammen mit den Punkten A und C die Eckpunkte von gleichschenkligen Dreiecken AP_nC mit der Basis $[AC]$.
Zeichnen Sie das Dreieck AP_1C für $\varphi = 20°$ in das Schrägbild zu 2.0 ein.

Aufgabe A2.3 (2 Punkte)

Zeigen Sie durch Rechnung, dass für die Länge der Strecken $[MP_n]$ in Abhängigkeit von φ gilt: $\overline{MP_n}(\varphi) = \frac{5,44}{\sin(\varphi + 65°)}$ cm.

Aufgabe A2.4 (2 Punkte)

Unter den Dreiecken AP_nC hat das Dreieck AP_2C den minimalen Flächeninhalt.
Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks AP_2C.

Aufgabe A2.5 (3 Punkte)

Die Punkte P_n sind für $\varphi \in]0°; 76,88°]$ Spitzen von Pyramiden $ABCP_n$ mit den Höhen $[P_nF_n]$, deren Fußpunkte F_n auf $[MB]$ liegen. Für das Volumen der Pyramide $ABCP_3$ gilt: $V_{ABCP_3} = \frac{1}{2} \cdot V_{ABCS}$. Bestimmen Sie das zugehörige Winkelmaß φ.

© Realschulrep.de


Lösung

Aufgabe A2.

Die untenstehende Zeichnung zeigt ein Schrägbild der Pyramide $ABCS$, deren Grundfläche das gleichseitige Dreieck ABC ist. Der Fußpunkt T der Pyramidenhöhe $[ST]$ teilt die Dreieckshöhe $[MB]$ des gleichseitigen Dreiecks ABC im Verhältnis $\overline{MT} : \overline{TB} = 1 : 2$. Es gilt: $\overline{MB} = 6$ cm; $\sphericalangle SBM = 65°$.

In der Zeichnung gilt:
$q = \frac{1}{2}$; $\omega = 45°$; $[MB]$ liegt auf der Schrägbildachse.

Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma.



Aufgabe A2.1 (1 Punkte)

Berechnen Sie die Länge der Strecke $[ST]$.
[Ergebnis: $\overline{ST} = 8,58$ cm]


Lösung zu Aufgabe A2.1

Länge einer Strecke

Gegeben: $\overline{MB} = 6$ cm; $\overline{MT} : \overline{TB} = 1 : 2$; $\sphericalangle SBM = 65°$

Gesucht: $\overline{ST}$

Im Folgenden wird das Dreieck STB betrachtet.



Bestimmen der Länge von $[TB]$:

Erläuterung: *Erläuterung*


Da $\overline{MT} : \overline{TB} = 1 : 2$ besteht die Strecke[MB]aus 3 Teilen.

Um die Länge $\overline{TB}$ zu berechnen, werden zwei der drei Teile benötigt.

$\overline{TB} = \frac{2}{3} \cdot \overline{MB} = 4$ cm

Bestimmen der Länge von $[ST]$:

Erläuterung: *Tangens eines Winkels*



Der Tangens eines Winkels α ist ein Seitenverhältnis.

$$\tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete zu } \alpha}{\text{Ankathete zu } \alpha}$$

Gilt nur in rechtwinkligen Dreiecken.

$\frac{\overline{ST}}{\overline{TB}} = \tan(65°)$

$\overline{ST} = \overline{TB} \cdot \tan(65°) = \underline{8,58 \text{ cm}}$

Aufgabe A2.2 (1 Punkte)

Punkte P_n liegen auf der Strecke $[BS]$. Die Winkel BMP_n haben das Maß φ mit $\varphi \in [0°; 76,88°]$. Die Punkte P_n sind zusammen mit den Punkten A und C die Eckpunkte von gleichschenkligen Dreiecken AP_nC mit der Basis $[AC]$.
Zeichnen Sie das Dreieck AP_1C für $\varphi = 20°$ in das Schrägbild zu 2.0 ein.

Lösung zu Aufgabe A2.2

Skizze

Gegeben:


Zeichnung der Pyramide $ABCS$ mit $q = \frac{1}{2}$, $w = 45°$ und Strecke $[MB]$ auf der Schrägbildachse.

Gefordert:

Einzeichnen des Dreiecks AP_1C mit Winkel $\sphericalangle BMP_1 = 20°$

Erläuterung: *Erläuterung*

Der Punkt P_1 ist der Schnittpunkt der Geraden $[MP_1]$ und $[BS]$. $[MP_1]$ schließt mit der Geraden $[MB]$ einen Winkel von 20° ein. Nachdem $[MB]$ auf der Schrägbildachse liegt kann der Winkel einfach mit dem Geodreieck abgemessen und $[MP_1]$ eingezeichnet werden.



© Realschulrep.de

Aufgabe A2.3 (2 Punkte)

Zeigen Sie durch Rechnung, dass für die Länge der Strecken $[M\,P_n]$ in Abhängigkeit von φ gilt: $\overline{M\,P_n}(\varphi) = \dfrac{5,44}{\sin(\varphi + 65°)}$ cm.


Lösung zu Aufgabe A2.3

2-dimensionale Geometrie

Gegeben: $\overline{M\,B} = 6$ cm

Zu beweisen: $\overline{M\,P_n}(\varphi) = \dfrac{5,44}{\sin\,(\varphi + 65°)}$ cm

Erläuterung: *Sinussatz*



In jedem Dreieck haben die Quotienten aus der Länge einer Seite und dem Sinuswert ihres Gegenwinkels denselben Wert. Es gilt:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

Anders formuliert:

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} \qquad \frac{a}{c} = \frac{\sin\alpha}{\sin\gamma} \qquad \frac{b}{c} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}$$

Im Dreieck $M\,P_n\,B$ gilt somit: $\dfrac{\overline{M\,B}}{\sin\!\measuredangle M\,P_n\,B} = \dfrac{\overline{P_n\,B}}{\sin\!\measuredangle B\,M\,P_n} = \dfrac{\overline{M\,P_n}}{\sin\!\measuredangle P_n\,B\,M}$

Für den Winkel $\measuredangle M\,P_n\,B$ gilt: $\measuredangle M\,P_n\,B + \measuredangle B\,M\,P_n + \measuredangle P_n\,B\,M = 180°$

$\Rightarrow \quad \measuredangle M\,P_n\,B = 180° - (\measuredangle B\,M\,P_n + \measuredangle P_n\,B\,M)$

$\Rightarrow \quad \measuredangle M\,P_n\,B = 180° - (65° + \varphi)$

Aufgrund des Sinus-Satzes gilt:

$$\frac{\overline{M\,P_n}}{\sin\,(65°)} = \frac{\overline{M\,B}}{\sin\,[180° - (65° + \varphi)]} \;|\cdot \sin\,(65°)$$

$$\overline{M\,P_n} = \frac{\overline{M\,B}\cdot\sin\,(65°)}{\sin\,[180° - (65° + \varphi)]}$$

$$\overline{M\,P_n} = \frac{6\text{ cm}\cdot 0,91}{\sin\,[180° - (65° + \varphi)]}$$

$$\overline{M\,P_n} = \frac{5,44\text{cm}}{\sin\,[180° - (65° + \varphi)]}$$

Erläuterung: *Funktionswerte der Sinusfunktion*

$\sin\,(180° - \alpha) = \sin\alpha$

Hier: $\sin[180° - \underbrace{(65° + \varphi)}_{\alpha}] = \sin(65° + \varphi]$

$$\overline{M\,P_n} = \frac{5,44\text{cm}}{\sin\,(65° + \varphi)}$$

Erläuterung: *Erläuterung*

In dem Term für $\overline{M\,P_n}$ kommt die Variable φ vor. Somit kann $\overline{M\,P_n}$ auch als Funktion von φ aufgefasst werden: $\overline{M\,P_n} = \overline{M\,P_n}(\varphi)$

Somit gilt für die Länge der Strecke $[M\,P_n]$ in Abhängigkeit von dem Winkel φ:

$$\overline{M\,P_n}(\varphi) = \frac{5,44\text{cm}}{\sin\,(65° + \varphi)}$$

Aufgabe A2.4 (2 Punkte)

Unter den Dreiecken $A\,P_n\,C$ hat das Dreieck $A\,P_2\,C$ den minimalen Flächeninhalt. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks $A\,P_2\,C$.

Lösung zu Aufgabe A2.4

Länge einer Strecke

© Realschulrep.de

Gegeben: $\overline{MB} = 6$ cm; $\overline{MP_n}(\varphi) = \dfrac{5,44 \text{ cm}}{\sin(65° + \varphi)}$

Gesucht: A_{AP_2C}, sodass A_{AP_2C} minimal ist für alle A_{AP_nC}

Erläuterung: *Höhe eines gleichseitigen Dreiecks*

Die Höhe h eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seitenlänge a berechnet man mit folgender Formel:

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Länge der Kante $[AC]$ bestimmen:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \overline{AC} = \overline{MB} \quad | \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\overline{AC} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \overline{MB}$$

$$\overline{AC} = 6,93 \text{ cm}$$

Flächeninhalt eines Dreiecks

Flächeninhalt A_{AP_nC} bestimmen:

Erläuterung: *Flächeninhalt eines Dreiecks*

Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist stets gegeben durch:

$$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$$

h_a ist die zur (Grund-)Seite a zugehörige Höhe.

$$A_{AP_nC} = \frac{1}{2} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{MP_n}$$

$$A_{AP_nC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\overline{MB}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{5,44 \text{ cm}}{\sin(65° + \varphi)}$$

Extremwertproblem

$$A_{AP_nC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\overline{MB}}{\sqrt{3}} \cdot \overline{MP_n}$$

Erläuterung: *Umformung, Sinussatz*

Laut dem Sinussatz gilt:

$$\frac{\overline{MP_n}}{\sin 65°} = \frac{\overline{MB}}{\sin(65° + \varphi)} | \cdot \sin 65°$$

$$\overline{MP_n} = \frac{\overline{MB} \cdot \sin 65°}{\sin(65° + \varphi)}$$

$$A_{AP_nC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\overline{MB}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\overline{MB} \sin(65°)}{\sin(65° + \varphi)}$$

$$A_{AP_nC} = \overline{MB}^2 \cdot \frac{\sin(65°)}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sin(65° + \varphi)}$$

Erläuterung: *Minimum der Funktion, Sinusfunktion*

Der Flächeninhalt ist ein Produkt. Dieses wird minimal, wenn die variablen Faktoren minimal werden.

Hier muss also der Quotient $\dfrac{1}{\sin(65° + \varphi)}$ den kleinstmöglichen Wert annehmen. Dies ist der Fall, wenn der Sinus im Nenner maximal wird. Der größte Wert den der Sinus annehmen kann ist 1. Dies ist der Fall für $+90°$.

$$\frac{1}{\sin(90°)} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\Rightarrow A_{AP_2C} = \overline{MB}^2 \cdot \frac{\sin(65°)}{\sqrt{3}} \cdot 1 = \overline{MB}^2 \cdot \frac{\sin(65°)}{\sqrt{3}}$$

$$A_{AP_2C} = 36 \text{ cm}^2 \cdot \frac{0,91}{1,73} = 36 \text{ cm}^2 \cdot 0,52$$

$$A_{AP_2C} = \underline{18,84 \text{ cm}^2}$$

Aufgabe A2.5 (3 Punkte)

Die Punkte P_n sind für $\varphi \in]0°; 76,88°]$ Spitzen von Pyramiden $ABCP_n$ mit den Höhen $[P_nF_n]$, deren Fußpunkte F_n auf $[MB]$ liegen. Für das Volumen der Pyramide

© Realschulrep.de


$A\,B\,C\,P_3$ gilt: $V_{\text{ABCP}_3} = \frac{1}{2} \cdot V_{\text{ABCS}}$. Bestimmen Sie das zugehörige Winkelmaß φ.

Lösung zu Aufgabe A2.5

Volumen einer Pyramide

Gegeben: $V_{A\,B\,C\,P_3} = \frac{1}{2} \cdot V_{A\,B\,C\,S}; \overline{S\,T} = \frac{2}{3} \cdot \overline{M\,B} \cdot \tan\,(65°)$

Gesucht: $\varphi = \measuredangle P_3\,M\,B$




Erläuterung: *Erläuterung*

Aufgrund der identischen Grundfläche verhalten sich die Volumina der Pyramiden $A\,B\,C\,S$ und $A\,B\,C\,P_3$ zueinander wie die jeweiligen Höhen $\overline{S\,T}$ und $\overline{P_3\,F_3}$.

$\overline{P_3\,F_3} = \frac{1}{2} \cdot \overline{S\,T} = \frac{\overline{M\,B}}{3} \cdot \tan\,(65°)$

$\overline{P_3\,F_3} = 4,29$ cm

Erläuterung: *Tangens eines Winkels*



Der Tangens eines Winkels α ist ein Seitenverhältnis.

$$\tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete zu } \alpha}{\text{Ankathete zu } \alpha}$$

Gilt nur in rechtwinkligen Dreiecken.

Winkel bestimmen

$\frac{\overline{P_3\,F_3}}{\overline{F_3\,B}} = \tan\,(65°) \quad | \cdot \frac{\overline{F_3\,B}}{\tan\,(65°)}$


$\overline{F_3\,B} = \frac{\overline{P_3\,F_3}}{\tan\,(65°)} = \frac{1}{3} \cdot \overline{M\,B} = 2$ cm

$\overline{M\,B} = \overline{M\,F_3} + \overline{F_3\,B}$

$\overline{M\,F_3} = \overline{M\,B} - \overline{F_3\,B} = \overline{M\,B} - \frac{\overline{M\,B}}{3} = \frac{2}{3} \cdot \overline{M\,B} = 4$ cm

© Realschulrep.de

Erläuterung: *Tangens eines Winkels*



Der Tangens eines Winkels α ist ein Seitenverhältnis.

$$\tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete zu } \alpha}{\text{Ankathete zu } \alpha}$$

Gilt nur in rechtwinkligen Dreiecken.

$$\frac{\overline{P_3F_3}}{\overline{MF_3}} = \tan(\varphi)$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\overline{P_3F_3}}{\overline{MF_3}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\cdot\tan^{-1}(65°)\right) = \underline{47°}$$